

(2)平成17年度富栄養化項目平均値一覧

水域	項目	全窒素	NO ₂ ⁻ -N	NO ₃ ⁻ -N	有機態 -N	全りん	PO ₄ ³⁻	クロロフィルa
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μg/L
北湖	平均	0.29	0.002	0.13	0.16	0.008	0.004	4.5
	春	0.36	0.002	0.17	0.19	0.010	0.004	9.0
	夏	0.22	0.002	0.05	0.17	0.009	0.004	2.7
	秋	0.22	0.001	0.06	0.16	0.007	0.003	4.6
	冬	0.34	0.002	0.22	0.12	0.007	0.005	1.7
	西岸	0.27	0.002	0.12	0.15	0.007	0.003	4.3
	中央	0.28	0.002	0.12	0.15	0.007	0.003	3.7
	東岸	0.31	0.002	0.14	0.16	0.010	0.005	5.5
南湖	平均	0.32	0.002	0.11	0.20	0.017	0.009	5.8
	春	0.35	0.003	0.12	0.23	0.017	0.005	7.7
	夏	0.27	0.003	0.06	0.20	0.019	0.014	4.1
	秋	0.23	0.001	0.04	0.19	0.015	0.009	5.0
	冬	0.43	0.003	0.23	0.18	0.018	0.006	6.6
	西岸	0.29	0.002	0.10	0.19	0.015	0.008	5.2
	中央	0.31	0.002	0.11	0.19	0.015	0.007	5.2
	東岸	0.37	0.003	0.14	0.22	0.023	0.011	7.7
瀬田川	平均	0.55	0.006	0.24	0.30	0.019	0.008	6.0
	春	0.56	0.008	0.21	0.34	0.021	0.005	7.4
	夏	0.45	0.008	0.13	0.30	0.022	0.012	7.5
	秋	0.55	0.004	0.23	0.31	0.015	0.007	4.2
	冬	0.63	0.003	0.38	0.24	0.018	0.007	5.0